TRATAMENTO NAO FARMACOLÓGICO DA DOR

Radioterapia

Vincent Van Gogh – Old Man in Sorrow
(On The Threshold of Eternity)

Radioterapia Paliativa – Tratamento da Dor

∅ Conflitos de Interesse

Radioterapia Paliativa – Tratamento da Dor

RADIOTERAPIA

Aceleradores Lineares

Raios X de alta energia

Dano Celular

Radioterapia Paliativa – Tratamento da Dor

Indicações em Contexto Oncológico Paliativo

DOR

Metastização Cerebral

Compressão tumoral local

Hemorragia

...

Radioterapia Paliativa – Tratamento da Dor

Indicações em Dor Oncológica

- 2/3 doentes estágio IV DOR
- Metástases ósseas (+ comum)
- 85% doentes com primário
- Metástases viscerais
- IASP (2009)
 - *Radiotherapy is the single most effective oncological treatment of cancer pain.*

© 2009 International Association for the Study of Pain®

**Global Year
Against
Cancer Pain**
OCTOBER 2008 – OCTOBER 2009

Radiotherapy in Cancer Pain

Two-thirds of patients with metastatic cancer experience pain. Pain originating from skeletal metastases is the most common form of cancer pain. Radiotherapy is the single most effective oncological treatment of cancer pain. In the treatment of bone metastases, the pain-relieving efficacy of both external radiotherapy and systemic radionuclide therapy is well documented. Radiotherapy is also effective in treating pain caused by soft-tissue tumors, although only a limited number of studies have investigated its efficacy in relieving pain caused by soft-tissue tumors.

The mechanism behind the pain-relieving effect of radiotherapy is incompletely understood. There is no direct correlation between the effectiveness of radiotherapy and the radiosensitivity of the tumor or the dose administered. Tumor shrinkage and inhibition of the release of chemical pain mediators seem to be the main mechanisms by which radiotherapy acts. The rapid onset of pain relief—within days—is attributed to the decrease of various chemical pain mediators, whereas tumor shrinkage and recalcification of osteolytic bone lesions contribute to the long-lasting effect [5].

Local Field Radiotherapy in the Treatment of Bone Metastases

- Several large controlled studies obtained complete pain relief in 15–60% of patients and at least 50% pain relief in 50–80% of patients. The onset of pain relief varied from a few days to 4 weeks, and the duration of relief ranged between 3 and 6 months [2,8,10].
- In a Cochrane analysis, radiotherapy produced complete pain relief in 25% of patients and at least 50% relief in 41% of patients at some time during the trials. The number-needed-to-treat (NNT) to achieve complete relief in one patient at 1 month was 4.2 (95% CI 3.7–4.7) [3].

Single-Fraction Therapy

- Single-fraction treatment (8 Gy) is as effective as a multifraction regimen with 20 Gy in 5 fractions or 30 Gy in

Radioterapia Paliativa – Tratamento da Dor

Radioterapia - Metastização Óssea

- Mecanismos de Ação
- Efeitos Sistémicos do Tratamento
- Preditores de Resposta
- Efeitos Sistémicos do Tratamento
- Mecanismos de Ação

Radioterapia Paliativa – Tratamento da Dor

Radioterapia - Metastização Óssea

- Eficácia

60 - 90% alívio parcial

10 - 40% alívio total

TABLE 94.2 RANDOMIZED TRIALS WITH ≥100 EVALUABLE PATIENTS COMPARING MULTIPLE-FRACTION TREATMENTS FOR PALLIATION OF BONE METASTASES

Study	Number of Patients (Number of Evaluable)	Dose (Gy)/Number of Fractions	Complete Response ^a (%)	Overall Response ^a (%)	Pathologic Fractures (%)
Tong et al., ⁶⁹ 1982, U.S. (solitary treatment site)	266 (146)	20/5 40/15	53 61	82 85	4 18
Tong et al., ⁶⁹ 1982, U.S. (multiple sites)	750 (613)	15/5 20/5 25/5 30/10	49 56 49 57	87 85 83 78	5 7 9 8

Table 2 New prospective studies comparing SF vs MF RT regimens (KQs 1-3)

Study	Overall response rates according to arm and conclusion		Investigator, y	Patients (n)	Fractionation	Complete or partial response (%)	Complete response (%)	Acute and late toxicity (%)	Repeat treatment rate (%)	
	ITT	ITT								
Chow, 2012 ⁸	Overall response	Overall response	5617 in 25 RCTs		SF	60	23	NR	20	
	Single	Multiple			MF	61	24			
Gutierrez Bayard, 2014 ⁴	Single	Multiple	90		8 Gy in 1 fx	79	17	NR	13.3	
	Single	Multiple			30 Gy in 10 fx	88	18			8.8 ^a
Anter	65	67	16	Howell, 2013 ⁵	235	8 Gy in 1 fx	70	19	10	15
	74	76				30 Gy in 10 fx	62	17%	20 ^a	5 ^a
El Hawwari	74	75	-	Majumder, 2012 ⁶	64	8 Gy in 1 fx	85	0	(acute grade 2-4)	NR
	73	82				30 Gy in 10 fx	77	0		
Majumder	65	67	9	Meeuse, 2010 ⁷	1157	8 Gy in 1 fx	53	NR	NR	7
	79	80				24 Gy in 6 fx	56			
Malik	79	80	20							
Malik	79	80	20	20	79	80	20	20		

Rich SE et al, Radiother Oncol (2018)

ASTRO Guidelines (2017)

Radioterapia Paliativa – Tratamento da Dor

Radioterapia - Metastização Óssea

- Efeitos Secundários

- Tratamento bem tolerado;
 - Toxicidade G2-4 (10-17%)
- Leves e limitados no tempo;
- Mais frequentes:
 - Náuseas e vômitos
 - Diarreia
 - *Pain flare* ($\approx$ 40%)
 - Fratura ($\approx$ 5%) – Δ localização / líticas

Radioterapia Paliativa – Tratamento da Dor

Radioterapia - Metastização Óssea

- Preditores de Resposta

- Tumores Líquidos (+ radiosensíveis)
- Componente Neuropático (↓ evidência)
- Intensidade Leve a Moderada da Dor (maior resposta)
- *SINS - Spinal Instability Neoplastic Score* (mets vertebrais)
 - Estabilidade espinal (score < 7) – 88% alívio
 - Instabilidade espinal (score > 7) – 58% alívio

Radioterapia Paliativa – Tratamento da Dor

Radioterapia - Metastização Óssea

- **Histologia**
 - Renal (↓);
 - Mama e Próstata – *early pain response*
 - *excluindo tumores líquidos*
- ***Opioid naïve***
 - *Dutch Bone Metastasis Group*: 956 doentes (pulmão, mama, próstata)
Sem diferenças
 - Válido para Dor com origem no tumor primário
- **Osteolíticas / osteoblásticas / mistas**
- **Idade, género, localização**

Radioterapia Paliativa – Tratamento da Dor

Radioterapia - Metastização Óssea

- Características do Tratamento

- Radioterapia Convencional
 - 3DRT

- Técnicas complexas
 - IMRT (VMAT)

Xinglei Shen (2012), Kimmel Cancer Center, Thomas Jefferson University Hospital

Radioterapia Paliativa – Tratamento da Dor

Radioterapia - Metastização Óssea

- Características do Tratamento

- Δt curto
 - Hipofracionamento (1 - 10 frações)
 - 1 dia – 2 semanas
 - < 15 min por fração
- Resposta ao tratamento
 - 1 dia – 2 meses
 - Média = 2 semanas

TABLE 94.4 RANDOMIZED TRIALS OF SINGLE VERSUS MULTIPLE FRACTIONS: RESULTS

Study	Number of Patients (Number Evaluable)	Dose (Gy)/ Fractions	Median Survival (mo)	Complete Response ^a	Overall Response ^a	Retreatment Rate (%)	Pathologic Fractures ^b (%)	Toxicity
Foro Arnalot et al., ⁷² 2008, Spain	160	8/1 vs. 30/10	6.5 7.6	15 13	75 86	2 28	NA	12% 18%
Kaasa et al., ⁷⁶ 2006, Norway/Sweden	376	8/1 vs. 30/10	9.6 7.9	NA	No difference	16 4	4 11	NA
Hartsell et al., ⁷⁴ 2005, U.S./Canada	949 (898)	8/1 vs. 30/10	9.1 9.3	15 18	65 66	18 9	5 4	10% grade 2-4 17% <i>p</i> = .002
Kirkbride et al., ⁷⁷ 2000, Canada	398 (287)	8/1 vs. 20/5	NA	22 29	51 48	NA	NA	NA
Steenland et al., ⁸³ 1999, Netherlands	1171 (1073)	8/1 vs. 20/5	7	37 33	72 69	25 7	4 2	No difference
Bone Pain Working Party, ⁷¹ 1999, U.K./New Zealand	761 (681)	8/1 vs. 20/5 ^c	NA	57 58	78 78	23 10	2 <1	No difference
Koswig and Budach, ⁷⁸ 1999, Germany	107 (107)	8/1 vs. 30/10	NA	33 31	81 78	NA	NA	NA
Nielsen et al., ⁸⁰ 1998, Denmark	241 (239)	8/1 vs. 20/5	NA	15 15	73 76	21 12	NA	No difference
Gaze et al., ⁷³ 1997, U.K.	265 (240)	10/1 vs. 22.5/5	NA	37 47	81 76	NA	NA	21% <i>p</i> = NS 26% emesis

Perez and Brady's, 6th ed. (2013)

- Radiote
- Radiote
- Cara
- Dose

• Fração única VS múltiplas frações

- 8 Gy controlo algico similar aos regimes mais longos;
- Re-tratamento mais frequente após fração única (fator de 1 a 3);
- Probabilidade de fratura RT-induzida semelhante;

Radioterapia Paliativa – Tratamento da Dor

Radioterapia - Metastização Óssea

- Características do Tratamento

- Impacto económico favorável
 - Custo-benefício ↑ VS terapêutica farmacológica;
 - **Fração única** melhor índice custo-efetividade;
 - RTOG 97-14 (2009); van den Hout WB (2003);
 - Short course – mean cost of \$2438*
 - Long Course – mean cost of \$3311*
 - Incremento quality-adjusted survival 1.7 semanas*
 - ↑ custo efetividade por QALY

Radioterapia Paliativa – Tratamento da Dor

Radioterapia - Metastização Óssea

There is no consistent dose–response relationship for palliation of bone metastases

Mecanismo de ação do papel antiálgico da Radioterapia
não está completamente esclarecido

Radioterapia Paliativa – Tratamento da Dor

Radioterapia - Metastização Óssea

80% Fibras C (TrkA +)
 80% Fibras A δ (TrkA +) ← NGF

Radioterapia Paliativa – Tratamento da Dor

Radioterapia - Metastização Óssea

- Mecanismos de Ação – DOR

+ Sensibilização SNC
 Conversão WDR em
 Nocicetivos

+ Neuroma / + Sprouting
 Novas fibras simpáticas

+ RANKL
 + Osteoclastos (RANK)
 + TRPV1

Prolif. tumoral
 + destruição fibras sensitivas
 Alt. limiaries estimulação

Alt. estrutura osso
 + Ativação nociceptores
 mecano-sensíveis

+ Fatores inflamatórios
 + sensibilização aferentes
 primários
 (+ NGF / VEGF + TRPV1)

Radioterapia Paliativa – Tratamento da Dor

Radioterapia - Metastização Óssea

Although treatment by external irradiation is successful in most patients the exact mechanism of action is unknown (Hoskin, 2003)

Alívio após doses não tumoricidas...

Alívio precoce (pré morte celular tumoral)...

Sem relação com tipo histológico/radiossensibilidade tumor primário...

Múltiplos mecanismos de ação?

Radioterapia Paliativa – Tratamento da Dor

Radioterapia - Metastização Óssea

- Mecanismos de Ação – RADIOTERAPIA

Efeito tumoricida

↓ células tumorais... osteoblastos + recalcificação... ↓ estimulação nociceptores mecânicos

↓ Osteoclastos

↓ cels tumorais (↓ RANKL) / destruição precursores osteoclastos... ↓ TRPV1

↓ Células inflamatórias

alteração microambiente BQ ... ↓ mediadores de dor (PGs, COX-2...)

...

Radioterapia Paliativa – Tratamento da Dor

Radioterapia - Metastização Óssea

- Mecanismos de Ação – DOR

Radioterapia Paliativa – Tratamento da Dor

Radioterapia – Técnicas Avançadas / SBRT

EMV ↑
Oligometástases

Objetivo: ↑ (Tempo de) Resposta; ↑ Controlo Local;

Imobilização

SBRT

Imagem

*Stereotactic Body
Radiation
Therapy*

Radiação

Radioterapia Paliativa – Tratamento da Dor

Radioterapia – Técnicas Avançadas / SBRT

SBRT

*Stereotactic Body
Radiation
Therapy*

- **Metástases ósseas (vertebrais)**
- **U. Pittsburgh (n=500)**
 - 86% controlo algico a longo prazo
 - 90% controlo tumoral longo prazo
 - > 20 estudos retrospectivos com os mesmos resultados
- **RTOG 0631**
 - fase II: tratamento seguro
 - fase III: controlo algico e QoL – resultados pendentes
- NCT01525745, NCT02407795...

Radioterapia Paliativa – Tratamento da Dor

Radioterapia – Direções Futuras

SBRT

*Stereotactic Body
Radiation
Therapy*

Alargar indicações (alta dose / volumes limitados)

SBRT Plexo Celíaco

Celiac Plexus Radiosurgery for Pain Management

David Hausner, M.D, Sheba Medical Center

NCT02356406

SBRT Carcinoma Irressecável do Pâncreas / Tumores Primários CeP e Tórax

Stereotactic radiotherapy of pancreatic cancer: a systematic review on pain relief - 12 estudos

Milly Buwenge

Short course accelerated radiation therapy (SHARON) in palliative treatment of advanced solid cancer in older patients: A pooled analysis

Eleonora Farina

University of Bologna, S. Orsola-Malpighi Hospital

Radioterapia Paliativa – Tratamento da Dor

Radioterapia – Mensagens Finais

- Tratamento eficaz (++) metastização óssea)
- Poucos fatores preditivos de resposta
- Resposta variável no tempo (1 dia – 2 meses)
- Fração única igual eficácia, ↑ P re-tratamento
- Múltiplos mecanismos de ação
- SBRT requer boa seleção de doentes
- Futuro: novas áreas (Tumores primários dolorosos, plexopatia...)